

Informationen für Kinder und Jugendliche zur COVID mit Biontec

- Die meisten Fälle von Myokarditis und Perikarditis im Zusammenhang mit einer mRNA-Impfung waren mild und die Patienten erholten sich schnell. Die längerfristige Nachverfolgung dieser Fälle ist im Gange.
- Die Symptome treten typischerweise innerhalb von 1-5 Tagen nach der Impfung auf und umfassen Brustschmerzen, Herzklopfen (unregelmäßiger Herzschlag), Synkope (Ohnmacht) oder Kurzatmigkeit. Personen, bei denen nach einer mRNA-COVID-19-Impfung eines dieser Symptome auftritt, sollten umgehend einen Arzt aufsuchen. Erste Untersuchungen bei Personen mit Symptomen oder Anzeichen einer Myokarditis oder Perikarditis sollten EKG, Troponin, Röntgenthorax und andere Untersuchungen für andere Differenzialdiagnosen, sofern klinisch indiziert, umfassen.
- Die meisten Vorerkrankungen des Herzens gelten *nicht* als Kontraindikationen für eine Impfung. Comirnaty ist ein empfohlener Impfstoff für Menschen mit Herzerkrankungen in der Vorgeschichte: Dazu gehören koronare Herzkrankheit, Myokardinfarkt, stabile Herzinsuffizienz, Arrhythmien, rheumatisches Fieber, rheumatische Herzkrankheit (RHD), Kawasaki-Krankheit, die meisten angeborenen Herzkrankheiten und Menschen mit implantierbaren Herzgeräte